

دراسة التركيب الججمي لسمكة الطاووس (*Crenilabrus pavo*)

عبدالقادر خليفة يوسف *

الخلاصة :

قد درست المكونات الججمية لسمكة الطاووس، وكذلك الأوجه الشكلية لعظام الججمة، وتبين هذه الدراسة الوحدات الوظيفية الججمية لكل من: القرنيوم العصبي، والجهاز المعلقي، والجهاز الفكي، والجهاز الخيشومي، وقد لوحظ أن القرنيوم العصبي يحمل كلا العظمين الجداري و فوق السمعي، كما لوحظ أن العظم الجانبي الوردي يوجد بدلا من الجبهي الأمامي، والعظم فوق الصدغي يتبع للقرنيوم العصبي، والعظام الأنفية تقع فوق المنطقة الوردية ، و مغطاة بالنتوء التصاعدي للفكي الأمامي، والجهاز المتعلق يحمل نموا جيدا لعظمي الجناحي والحنكي ، والخيشومي الأمامي مشرشر و له نتوء "السميلي" ، و سلسلة الغطاء الخيشومي يحتوى على: الخيشومي ، وتحت خيشومي ، و البين الخيشومي ، كذلك الأسنان تحمل على كل من الفكي الأمامي و السنى.

المقدمة :

الفهم المناسب للاحتجوأ المباشر وغير المباشر للتراكيب الجسمية هو ضروري عند تقييم خصائص الأسماك العظمية ، والمكونات القرنومية خاصة ، و معظم الخصائص الشكلية هي مرتبطة بالمتطلبات الوظيفية و منشأها. وقليل من الدراسات عملت في هذا المجال ، ذلك إن استثنينا عمل العالم Gregory (1933) و ما قام به في الوصف الججمي لأسماك Labrids .

تعظم سمكة Catfish أول ما درست من العالم Bliss (1871) ، حيث لاحظ الاندماج التدرجى للفقرات الأمامية في سمكة Doras niger . و التعظم الكامل لسمكة Amiurus كان قد درس لأول مرة من قبل العالم McMurrich (1884) . Regan (1911a) درس تعظم أسماك Siluroidei من حيث المساهمة في مجال التصنيف ، كذلك Kindred (1919) كان أول من ثبت التمازج الشكلي للعظم القرنومية ، و العالمان Bhimachar (1933) و Gregory (1933) قاما بدراسة مقارنة جماجم العظميات (teleosts) . Walter (1998) فلاحظا أن التعظم المتذبذب في ججمة سمكة Dominique .

* قسم علم الحيوان، كلية العلوم، جامعة بنغازي / ص ب: 9480، ليبيا Abdulgader_khalifa4@gmail.com



يبدو أنه يتعلّق بالمتطلبات الوظيفية التي تنشأ أثناء النمو اليرقي. Clarias gariepinus Power (Faustino 2001).


وقد أوضحا أن العظام الأدمية في هيكل القرنيوم الحشوي لسمكة *Sparus aurata* (sea bream) تعظم قبل العظام الإزاحية (المستبدلة من الغضروف).

(Regan 1911b) وصف العظام السمعية الخارجية لأسماك *Gobiodoids* بأنها مفصولة باللقم القذالية. (Miller 1955) Gosline (1973) لاحظا في الجهاز المعلق لسمكة *Gobiodoid* أن هناك دعامة خلفية تكون من المربعي والخيسموني الأمامي، وذلك بعد دراستهما للنمو ضمن العظميات *Gloria Hans-peter* (1991) لاحظا أن فقدان المربعي - الودجي وجود نتوء خلفي بطني للمربعي هو تشابك شكري للعظميات. (Iwai 1959) لم يفلحا في إيجاد عظم "السمبلاتك" في سمكة *Kraemeria sex radiate Matsubara*

(Gregory 1933) وصف أسماك *Labridae = Wrasses* بأن لها فما طرفياً أفقياً ذا فكوك بارزة؛ وذلك لتمدد الأمامي والمنخفض للبوز. (Nawar 1954) أعطى نبذة كاملة بدلائل على تعظم سمة *Wallago attu* درس تعظم سمة *Clarias lazera Joseph* (1960) دون أن القرنيوم العصبي هو مسطح قاعدي وغياب الحفر الصدغية. (Smith 1960) كتب أن القرنيوم العصبي بدأ في الكائنات الحبلية المبكرة كتركيز فردي ، وظيفته الرئيسية كانت الوقاية والدعم للمخ والمحافظة الحسية ، والتركيب الثاني طبقاً-Smith (1960) هو القرنيوم الأدمي والمغلف للقرنيوم العصبي . والتركيب الثالث هو القرنيوم الحشوي المكون لهيكله ، و العامل كقواعد جينية للفكوك و العناصر المعلقة لها ، عند دراسة النمو المبكر لسمكة *Ristovska letnica Salmo* ، العالم آخرون (2006) لاحظوا أن معظم التراكيب الغضروفية للقرنيوم العصبي و الحشوي موجودة في لحظة تفقيس هذه الأنواع.

(Colbert 1961) وجد في جنس أسماك *Climatius* أن الفك العلوي أو المربع- الحنكي كان خالياً من الأسنان ، إلا أن الفك السفلي مزود بأسنان. (Gosline 1955) ذكر أن اللوح غائب في أسماك *Gobiodon Awaous* وكلا من اللوح و الغرابي مفقودان في أسماك *Kraemeria , Kellogella , Ptereleotris , Microdesmus*.

طبقاً للعالم (Marshall 1965) صندوق مخ (القرنيوم العصبي) الأسماك المشععة العظمية مسنود بدعامة عظمية ، وهي العظم الإسفيني ، الممتد من السمعي إلى المناطق الأنفية ، مكوناً سقف الحنكي. Vandewalle و آخرون (1992) لاحظوا أنه في أثناء نمو الهيكل الرأسى



لسمكة Barbus barbus أول عظم يبدأ بالظهور هو الإسفيني أما العظام الأخرى كالزاوي، المربعي و بين الخيشومي ، فهي تنمو لاحقا. Koji و Norihiro (2008) أوضحا من خلال النمو الوراثي للعظميات أن عظمي الزاوي - المفصلي لسمكة Oreochromis niloticus تتكون من الزاوي الأدمي والفصلي المستبدل (إزاحي). في تركيب الهيكل الداخلي لسمكة Cheirolepis ، العالم Sam و آخرون (2015) وصفاً أوجهاً جديدةً للعظم الإسفيني ، الميكانيكي والحراسف.

من ملاحظات العالم Hildebrand (1974) أن الرئويات فقط التي بها المربعي - الحنكي ملتحم بصندولق المخ ، و كذلك لاحظ أن في الأسماك العظمية القديمة المعروفة ، الأقواس الخيشومية ربما تتكون من نسيج عظمي (في الأسماك المشععة) أو غضروفية (في الرئويات) و لا تختلف كثيراً عن المدرعات الفكية (Placoderm) وأسماك الغضروفية. Gloria (1990) شاهد أن في نمو الجهاز المعلق لأسماك Siluroids هناك علاقة بين المربع- الحنكي و المربعي - الجنحبي ، حيث يكونان لاحقاً صفيحة من اللامي - الفكي و المربعي - الحنكي. Birdsong (1975) لاحظ أن العظام الجدارية على ما يبدو أنها غائبة في أسماك Gobioids كلها ، وفي البحث نفسه اشار العالم أن في أسماك Microgobius أسنان الفكي الأمامي لها ثلاثة نتوءات ، و السنى يهيمن على الأربع عظام المكونة للنصف الواحد من الفك السفلي .

طبقاً للعالم Orr (1976) في الجهاز الهيكلـي للأسماك الكاملة التعظم ، العظام الأدمية متعددة و تشكل درعاً حول الججمة ، و أجزاء من القرنيوم الغضروفـي (Chondrocranium) استبدلت بعضـم في مناطق اللقم القذالي، الوتـدي ، السمعـي و المصـفـوي. Miller (1977) لخص أن في الأسماك العظمـية ، الحزـام الصـدرـي يـشـمـلـ كـلاـ منـ العـظـامـ المـسـبـدـلـةـ وـ الأـدـمـيـةـ Benjamin (1986) وـصـفـ المـمـصـ الفـمـيـ لـسـمـكـةـ Gyrinocheilus aymonieri وـاستـنـتـجـ أنـ منـ النـاحـيـةـ الشـكـلـيـةـ الفـكـ السـفـلـيـ هوـأـقـصـرـ منـ العـلـوـيـ ، وـلـيـسـ هـنـاكـ أـسـنـانـ عـلـىـ الفـكـينـ.

فالهدف من الدراسة هو توضيح المكونات الهيكلية الدقيقة لجمجمة سمكة الطاووس ، و المساهمة في حركة الفكين ، المؤدية إلى نوعية التغذية .

مواد و طرق العمل:

عينات سمكة الطاووس اختيرت لدراسة المكونات القرنومية ، و ذلك لتواجدها على امتداد جميع المواسم ، و أن لها فكوكاً بارزة ملفتة.



أسماك الطاووس = *Crenilabrus pavo* (Cuv. & Val.) (شكل 11) جمعت من بحر جليانة، و هي منطقة صغيرة من مدينة بنغازي. العينات جمعت بمساعدة الصيادين المستخدمين لشبكة الصيد.

خمسة وعشرون عينة من الحجم الكبير ذاته (متوسط طولها ما بين 15-16 سم) حفظت في محلول التحنط (المذكور لاحقاً) انتظاراً للخطوات المعملية. الدراسة الهيكلية أجريت باستخدام تقنية Hollister (1932) المتضمنة لصبغة Alizarin-red-sulfonate والمادة المنظفة، و المعروفة بالجلسرين-بوتاسيوم هيدروكسايد.


وقد حفظت الأسماك في محلول الفورملايد (ذي تركيز 100 مل فورمالين + 750 مل ماء مقطر). العينات نقلت إلى محلول 3% بوتاسيوم هيدروكسايد (KOH) لمدة ساعتين، ثم إلى المياه المقطرة، بعد ذلك فصلت عضلات الرأس بحذر؛ للحصول على عظام الجمجمة سليمة، ثم نظفت جيداً، و خزنت جمام العينات المعالجة بمحلول KOH في محلول "الألزارين" إلى أن صبغت العظام.

و الجمام مررت في نسب مختلفة من الماء المقطر و محلول الجلسرين لمدة من 5 إلى 7 أيام. وفي آخر المطاف العينات حفظت لفحصها في 100% جلسرين. وبعد ذلك فككت الجمام بتخزينها في محلول 5% بوتاسيوم هيدروكسايد.

التشريح واللاحظات والتوضيحات أجريت باستخدام مجهر التشريح M-5 المزود بآلية تصوير "لوسيدا". تخطيطات مختلف أوجه (الظهري، البطني، الجانبي) الجمام (شكل 10) رسمت و المكونات القرنومية المفككة هي كذلك رسمت بالطريقة نفسها باستخدام تصوير "لوسيدا". العظام المتفككة في النهاية حفظت في أو عبة صغيرة تحتوي على قطع الفئالين. مصطلحات التسمية العربية العلمية هي التي استخدمت للعظم القرنومية.

النتائج:

تركز الوصف على معظم تركيب الجمجمة، فالجمجمة قسمت إلى القرنيوم العصبي المتضمن لصندوق المخ و المحافظ الحسية المحتوية على المخ وأعضاء الحس. القرنيوم العصبي (مساحة النقط الرفيعة لشكل 1) المكون من العظام الغشائية يحمل زورقاً وسطياً من الناحية الظهرية الخلفية، و له حفرة متعددة في النصف الخلفي لسطحه الظهري، سقف صندوق المخ يتربّك من أزواج لعظام الأنفية، الجبهية، الجدارية، و لقمة قدالية على التوالي من الأمام إلى الخلف (شكل 4B).



***الأنفي :**

عظم مزدوج يقع أعلى المصافي ، و معلق بالعظام الحاجبية العلوية. كل أنفي يحوز على قناة حسية جانبية للحجاج العلوي (شكل: 2، 3، 4).

***الجبهي :**

عظم مزدوج يكون التحامًا مشتركاً على امتداد الخط الأوسط للجمجمة ، مساحته تصيق بين الحجاجين ، و تتسع خلفيا لتكون معظم النصف الأمامي لسقف القرنيوم ، و كل حافة جانبية له تحمل قناة حسية للحجاج السفلي ، و على سطحه البطني القريب من الجزء الخلفي للحجاج يكون التحامًا مع الإسفيني الجنحبي (شكل: 2،3،4).

***الجداري :**

الجداري يكون التحامًا بعظام: السمعي - الجنحبي جانبيا، السمعي - العلوي خلفيا و بالقذالي-العلوي ظهريا. الجداري يتداخل من الناحية الأمامية الوسطى بالجبهي (شكل: 4، 8).

***القذالي العلوي:**

العظم يشغل المساحة الوسطى الخلفية لسقف القرنيوم ، و حافته الأمامية تتدخل مع الجبهي . العظم يتمفصل مع الحافة الظهرية للقذاليين الخارجيين ، و امتداد خطه الأوسط يرسل ذروة بارزة (شكل: 2، 3، 4، 7).

***المنطقة القرنومية القاعدية:**

الناحية البطنية-الوسطية لقاعدة القرنيوم تتمايز إلى تركيب زورقي شمل الميكوعي و المناظر الإسفيني ، و العظم الأخير مع القذالي القاعدي ينموا بطيئا نتوءات بلعومية. خلف الحجاج ، السمعي - الإسفيني و السمعي - الجنحبي يساهمان في إيجاد حفرة ضحلة على الأوجه البطنية لتحتضن رأس الفكي الأمامي ، و هي التمفصل بين الفكي اللامي و القرنيوم. أمام الحجاج ، جانب المصافي يحتضن تمفصل تعربي للحنكي و الجهاز المعلق. الزاوية الأمامية البطنية للسمعي الإسفيني تمتد على هيئة نتوء اسطواني في اتجاه الخيشومي الخلفي، قاع صندوق المخ يتكون من الميكوعي ، مصافي الأوسط ، المصافي الجانبية ، الإسفيني المناظر و القذالي القاعدي (شكل: A 4) .

*الميكوعي :

عظم مفاطح خال من الأسنان ، له شوكة خلفية تلتحم بالتمدد الأمامي للإسفيني المناظر ، والعظم مغطى بالكامل بزوج من النتوءات الصاعدة للفكي الأمامي (شكل: 1، 2، 3، 4، 7).

*المصفوي الوسطي :

يتداخل خلفياً بالجبهي وأمامياً بالميكوعي ، سطوحه الأخرى تمفصل مع المصافوي الجانبي (شكل: 4، 7).

*المصفوي الجانبي :

هو المكون لغالبية الجدر الأمامية للحجاج ، وزاويته البطنية تمفصل مع الدمعي (شكل: 4، 7).

*الإسفيني المناظر :


هو المكون لمعظم القاع الأوسط للجمجمة ، وأمامياً هو الفاصل بين الحجاجين ، ويتداخل مع البروز الخلفي للميكوعي ، العظم السمعي الأمامي جانبياً ، والقذالي القاعدي خلفياً ، هذا العظم يتسع عند الحافة الخلفية للحجاجين مكوناً جناحين جانبيين ، كل جناح يكون تمفصلاً مع الإسفيني الجنائي المقابل (شكل: 1، 2، 4، 8).

*القذالي القاعدي :

هو المكون لقاع القرنيوم الخلفي ، ونحواته الخلفية تكون سطحاً دائرياً يتمفصل مع مركز أول فقرة ، ويتمفصل أمامياً بالسمعي الأمامي ويتجاور مع القذالي الخارجي ، الذي تلتقي زوايته على امتداد الخط الوسطي لقاع الثقب الكبير ، والعظم الأخير يتداخل مع القذالي القاعدي المحاذي للإسفيني المناظر ، وينعنه من المشاركة في تكوين الثقب الكبير (شكل: 4، 7، 8).

*القذالي الخارجي :

يكون معظم الجدار الخلفي للقرنيوم ، وكذلك سقف الثقب الكبير وقاعه ، كما أنه يتداخل مع القذالي العلوي ، العظام السمعية ، ويكون الحدود الخلفية للحفرة الصدغية السفلية ، مكوناً كذلك اللقمة القذالية المتتمفصلة مع أول مركز فقرى ، جانبي صندوق المخ غير كاملة ، وذلك للوضع السطحي لعظم المصافوية والسمعية في كل جانب ، وحيز حجاج مقلة العين يقع جانبياً ، وعظم الغشائية المساهمة في تكوين حدوده هي الدمعي ، الحاجاج السفلي والخلفي (شكل: 3، 4، 7).



*الاسفيني الجناحي :

يقع تحت الجبهي بالقرب من النهايات الخلفية للحجاجين ، ولها تمفصل بالجهي السمعي الوندي السمعي الأمامي ، ومرتبط بالوندي المناظر (شكل: A4، 7).

*الدمعي :

هو مثلث الشكل ، يقع أمام الحاج و قليلاً أعلى من الحنكي ، أمامياً يكون الجدار الجانبي للمحفظة الشمية ، وخلفياً يكون الحدود الأمامية للحجاج ، فرع الحاج السفلي للقناة الحسية يخترق قاعدة الدمعي (شكل: 2، 3).

*الحجاج:

ظام رفيعة كالدمعي ، الحاج السفلي ، الحاج الخلفي و الحاج العلوي تشارك في تكوين إطار الحاج (شكل: 2، 3).

*المحافظة السمعية تتكون من:

(أ) السمعي الأمامي : المساهم في قاع صندوق المخ ، الملتحم مع السمعي الاسفيني ، والسمعي الجناحي ، والحفرة الصدغية السفلية والاسفيني المناظر ، ويخترق السمعي الأمامي بحفرة وجهية كبيرة تفتح في صندوق المخ (شكل: 4).

(ب) السمعي البيني : (شكل: 8) المشابه لجناحين و الواقع على جنبي السمعي الأمامي متداخلاً مع الجبهي ، هذا العظم له نتوء بطني موجهاً إلى الأخدود الظاهري للإسفيني المناظر.

(ج) السمعي الإسفيني : (شكل: 4، 7) و المكون للحوار الخلفية للحجاجين ، و العظم يحمل حفرة تساعد على تمفصل الرأس الأمامي للكي اللامي ، و له ثقوب صغيرة لاستقبال تمدد جناح السمعي الإسفيني.

(د) السمعي الجناحي : (شكل: 4ن 8) و المكون للأوجه الجانبية الخلفية للقرنيوم ، و المتمفصل مع العظام السمعية الأخرى و القذالي الخارجي خلفياً ، كما أنه يتداخل قليلاً مع الجبهي و الحفرة الصدغية السفلية بطانياً.

(هـ) السمعي العلوي : (شكل: B4، 8) و المكون للزاوية الخلفية للمحافظة السمعية ، و المتمفصلة مع أنواع العظام القذالية و يتداخل أمامياً بالجداري ، و العظم يخترق بفرع من القناة الحسية ، و يحمل نتوء خلفي صغير يتمفصل بالذراع الظاهري للصدغي الخلفي (شكل: 2، 3).

*الجهاز المعلق يشمل:

- أ) الحنكي الذي له شكل-T، نتوءاته تمفصل بوجود حركة انزلاقية مع العظام الفكية و له اتصال بالعظم الجناحية (شكل: 2، 3، 5، 6، 8، 9).
- ب) المربعي (شكل: 2، 5، 8) شكل مثالي ، رأسه الأمامي يتمفصل مع الفكي ، و ظهريا يتمفصل مع العظام الجناحية، و ذراعه الخلفي الطويل ينطبق على التمدد الأمامي للخیشومي الأمامي.
- ج) الجناحي الخلفي و المتعدد خلفيا ليتمفصل بالفكى الامامي و وجه الأمامي يقابل الجناحي الخارجى.
- د) السيفي شكله على هيئة سيف ، ناحيته الأمامية ترتبط بالجزء الخلفي للمربعى.
- هـ) الفكي الامامي الذى له ثلاثة دعامات اسطوانية ، تمفصل بالعظم السمعية ، و منها ما يتمفصل بالعظم الخیشومي ، و العظم سطحه الأمامي يستقبل الجناحي الخلفي و وجه الأوسط له ثقب كبير لتمرير العصب الوجهي .
- و) الخیشومي الأمامي له شكل-L محتواها على تشرش و أخدود على امتداد حافته الظهرية الخلفية .

*الجهاز الخیشومي (الخطوط المتقاطعة الرأسية، شكل: 1)

يتكون من ثلاثة أزواج للعظم المتعلقة بالنتوء الخیشومي للفكي الأمامي، وهذا التمفصل يؤدي إلى حركة فردية للجهاز الخیشومي حول الزاوية الخلفية للمفصلي الزاوي ، بمساعدة الرابط الفكي بين خیشومي.

* الغطاء الخیشومي:


مثالي الشكل ، يقع خلف الخیشومي الأمامي ، و يتمفصل بالنتوء المفصلي الخلفي للفكي الامامي، و العظام الخیشومية تتحدد ظهريا بالفكين الاماميين ، و بطانيا بالخیشوميات السفلية و البينية (شكل: 2، 3، 5، 9).

* الخیشومي السفلي:

هاللي الشكل ، يتداخل مع الخیشومي ظهريا و الخیشومي البيني بطانيا (شكل: 2، 5، 9).

* الخیشومي البيني:

له شكل-J بوجود حواف محدبة بطانيا ، و مقعرة ظهريا و يقع بطانيا للخیشومي و الأذرع المربعة ، و يتصل بالروابط أماميا مع المفصلي الزاوي و خلفيا باللامي العلوي (شكل: 2، 5، 9).



* الجهاز الفكي (الخطوط الرأسية الداكنة، شكل: 1)

هو الوحدة الثانية لمكونات القرانيوم ، و هو يرتبط بالقرنيوم العصبي بوجود اتصال المربع بالقوس اللامي ، والفكى العلوي منه (شكل: 5) يتكون من الفكى و الفكى الأمامى الحامل للأسنان.

* الفكى الأمامى:

له شوكة خلفية و ذراع جانبي ، يساعدان في تمفصل تزحفي ، يربط بين النتوء التصاعدي للفكى الأمامى و القرنيوم العصبي (شكل: 2 ، 3 ، 5 ، 6).

* الفكى:

هو على هيئة W ، نتوءاته تمفصل مع الفكى الأمامى و الحنکي ، و يتصل بهما بوجود أنسجة رابطة (شكل: 2 ، 3 ، 5 ، 6).

* الفك السفلي:

يتكون رئيسياً من عظمين أدميين مزدوجين هما السنى و المفصلي الزاوي ، فالسنى (شكل: 2 ، 3 ، 6 ، 8) له 12 سنًّا فكية على كل جانب ، و له تجويف خلفي يستقبل الأذرع الأمامية للمفصلي الزاوي (شكل: 5).

* المفصلي الزاوي:

له تقعير بشكل سرج ، يتمفصل خلفيا بنتوء مفصلي للمربعي و يلتحم أماميا بالسنى (شكل: 2 ، 5 ، 8).

* السمبلاكت:

عظيم مدبب ، مثلث الشكل ، محصور بين ثلاثة عظام ، و هي: الفكى اللامى ، الجناحى الخلفى ، و المربعي (شكل: 2 ، 5).

المناقشة:

دراسة المكونات القرنومية لرتبة Teleosts من العظميات اكتسبت العديد من الدراسات الشكلية المهمة، و تعظم رأس سمكة الطاووس يقدم عدداً من التحورات المثيرة في مكونات ججمتها، و ذلك أن الغضاريف و العظام الأدمية متعددة ، و هي المكونة لأجزاء القرنيوم العصبي و القرنيوم الخيشومي ،



اول التراكيب و العناصر الغضروفية المتعضمة في نمو سمكة Sparus aurata يبدو أن لها علاقة بالمتطلبات الوظيفية (Power Faustino , 2001) .

عادة في الأسماك الكاملة التعظم الحديثة (Teleosts) زاوية الفم محددة بالفكوك العلوية و السفلية، إلا أن في سمكة الطاووس الفكوك و الفكوك الأمامي تقف بعيداً قليلاً عن زاوية الفم، وذلك أن الفم يتكون من أنسجة أدمية مرنة ، مما يؤدي إلى زيادة تجويف الفم. Joseph (1960) وجد النظام الشكلي نفسه في سمكة Wallago attu .


سمكة الطاووس مجهرة بصف واحد من الأسنان على عظمي الفكي الأمامي و السنبي فقط، والحالة نفسها لاحظها العالمان Norihiro Okada و Koji Fujimura (2008) في سمكة Nile tilapia (1960) وصف سمكة W.attu أن لها العديد من صفوف الأسنان المتوجهة إلى الخلف على مختلف عظام الفم. في سمكة Microgobius signatus أسنان الفكي الأمامي و السنبي تقع في صفين غير واضحه (Birdsong , 1975) .

وشوهدت اثار للحفر الصدغية في سمكة الطاووس ، و هي متماشية مع ما وجده العالم Mc Murrich Joseph . (1975) Birdsong (1933) Bhimachar (1893) Haddon (1884) و Bridge (1960) خلص الى غياب الحفر الصدغية في سمكة W.attu .

وصف في سمكة Ictalurus lacustris punctatus (1948) Eaton وجود روابط و اصلة بين جانب الجناحي و العظم الحاجي الثالث، ولم نلاحظ هذا التواصل للروابط في سمكة الطاووس، و الحالة نفسها وجدت من قبل العالم Joseph (1960) و في سمكة M.signatus من العالم Birdsong (1975) .

استنتاجاً أنه ليس هناك تفصيل بين الميكانيكي الأمامي و الجانب الوردي، ولكن في سمكة الطاووس هناك تفصيل وثيق بين العظمين المذكورين آنفاً، التفصيل نفسه يوجد في سمكة Clarias lazera (Nawar , 1954) .

في عظميات Teleosts القاعدي الإسفيني عامه يوجد فوق المناظر الإسفيني، أثناء النمو العظمي لسمكتي Cynoscion nebulosus و Sciaenops ocellatus (2015) Kevin Kole أوضح العالمين أن القاعدي الإسفيني لا يظهر إلا في المراحل المتأخرة من النمو. Walter Dominique (1998) في سمكة African catfish بينما أن تعظم المناظر الإسفيني ربما يتعلق بتغطية المخ أثناء نقل الفريسة، في سمكة الطاووس العظم بين سمعي له نتوء وسطي بطني رفيع يتجه إلى الأخدود الظهري للمناظر الإسفيني،



حسب نتائج العالمين Sagemehl (1884) و Berg (1904) العظم بين سمعي مفقود في سمكة Siluroids Bhimachar. Ostariophysi حيث تندمج الناحية البطنية لهذا العظم مع المناظر الإسفيني، وفي سمكة *M.signatus* (Birdsong 1975) القاعدي الإسفيني غائب.

وفي سمكتي R.buchanani للعالم (Joseph 1960) و سمكة W.attu Bhimachar (1933) لاحظاً أن القذالي العلوي لا تشارك في تشكيل الثقب الكبير، وفي سمكة الطاووس عظم القذالي العلوي يكون تمفصلاً مع التمفصل الظاهري للقذالي الخارجي. Birdsong (1975) لاحظ أن في سمكة *M.signatus* القذالي العلوي يكون ذروة علوية ، إلا أن عظام فوق السمعية تكون تمفصلاً تحت القذالي العلوي ، وهي تشغل الحيز الذي عادة مغطاة بالعظم الجدارية، العظام الجدارية واضحة أنها غائبة في كل أسماك Gobioids (Regan 1911b, Gregory 1933, Gosline 1955). في سمكة W.attu Goodrich (1930) Joseph (1960) القذالي العلوي يتمفصل فقط مع الشوكة العصبية للمركب الفكري.

في سمكة الطاووس العظام القذالية الخارجية تلتقي على أمتداد الخط الأوسط لقاع الثقب الكبير، و ذلك أنها تستثنى القذالي القاعدي من أن يشارك في تكوين الثقب الكبير، و الحالة نفسها توجد في سمكة *M.signatus* (Birdsong 1975). في سمكة W.attu Joseph (1960) القذالي القاعدي ملتحم بقوه مع أول فقرة ، و لا يشارك في تكوين الثقب الكبير، و القذالي القاعدي في سمكة C.lazera (Nawar 1954) و في سمكة R.buchanani Bhimachar (1933) في كليهما يتمفصل مع مركز الفقرة المركب، و في سمكة Gadus *aor*، الثقب الكبير مرتبط سفليا بالقذالي القاعدي، من أعلى بالقذالي العلوي ، و في كل جانب بالقذالي الخارجي المزدوج (De beer 1966).

هناك اختزال حجمي و عددي لعظمان الجناحية في سمكة Siluroidei و هي الحالة الموجودة في سمكة الطاووس وكذلك سمكة Silundia gangetica (Liem 1967)، بينما في سمكة H.temmincki (Plotosus canius, Bhimachar 1933) في أسماك Macrones aor (Bhimachar 1933) و Pangasius عظام الثلاثة الجناحية موجودة . في أسماك *R.buchanani* بين أشكال العظام المذكورة ربما تفهم بمدى علاقة العظام الجناحية الخارجية مختزلة، و درجة التخصص و العظام المربيعة، وفي سمكة Silundia gangetica الجنافي الخارجي له تمفصل وثيق بالميكوعي الأمامي ، و هو مسنان ، و تستثنى مشابه لما هو موجود في الميكوعي الأمامي، و في سمكة الطاووس



و كذلك في سمكة *W.attu* Joseph (1960) الجناحي الخارجي مختزل ، و يتصل بالروابط فقط مع الميكوعي الأمامي، و في سمكة *M.signatus* Birdsong (1975) الجناحي الخارجي يرتبط خلفياً بالمربعي ، و يتدخل أمامياً بالنتوء النازل للحنكي ، و في سمكة *C.lazera* Nawar (1954) الجناحي الخارجي ليس له أي علاقة بالميكوعي الأمامي ، الا أن له تداخل بيناً وثيقاً بالمربعي.

و في سمكة الطاووس العظام الزاوية غائبة ، و أماكنها عند تكوين الفك السفلي يبدو أنها استغلت من قبل المنطقة الخلفية للعظم المفصلي ، و الحالة نفسها شوهدت في سمكة *Astatotilapia elegants* Aerts (1985) و المسماى فيها بالعظم المفصلي- الزاوي، وفي سمكة *M.signatus* Birdsong (1975) العظم الزاوي متصل اتصالاً وثيقاً بالوجه الأوسط للمفصل، و في أسماك *W.attu* Joseph (1960) و *H.temmincki* Liem (1967) العظم المفصلي سمي بالعظم الزاوي.


العظم المزدوجة الأنفية لسمكة الطاووس هي أنبوبية الشكل ، و تقع على جانبي المصفووي، و كل أنفي هو معلق بالخیشومي العلوي، و الحالة نفسها موجودة في سمكة *W.attu* Joseph (1960) و في سمكة *Gadus* De Beer (1966) . في سمكة *H.temmincki* Liem (1967) الروابط تربط العظام الأنفية العريضة بالرأس الظاهري للفكي، و في سمكة *M.signatus* Birdsong (1975) العظام الأنفية صغيرة الحجم ، و معلقة بأنسجة رابطة على المنطقة المصفووية للجمجمة.

مكونات الأغطية الخیشومية كلها في سمكة الطاووس موجودة ، و تكون ارتباطاً قوياً ببعضها، أضف إلى ذلك أن الخیشومي الأمامي له مظهر تشرشري ، والموجودات نفسها شوهدت في سمكة *H.temmincki* Liem (1967) . لا تشرشر و لا ارتباط بيني موجود بين عظام الغطاء الخیشومي في أسماك *Gyrinocheilus amonieri* Birdsong (1975) و *M.signatus* (1966) De Beer و *Gadus* (1960) Joseph . Benjamin (1986) لاحظ غياب الخیشومي السفلي في سمكة *W.attu*.


في سمكة الطاووس هناك نمو جيد للعظم الرابط بين الصدر و الججمة ، كذلك العالم De Beer (1966) رأى الحالة نفسها في سمكة *Gadus* بينما العالمين Liem (1967) في سمكة *H.temmincki* و Birdsong (1975) في سمكة *M.signatus* لم يوصفا هذا الرابط الصدري- الججمي.




عظمي "السميلكتك" لوحظ أنه غير موجود في كل من Joseph (1960), W.attu و Nawar (1954) ولكن هنا في سمكة الطاوس لوحظ وجوده المثلثي في القوس اللامي، A.testudineus وفي سمكتي Birdsong (1975), M.signatus و Khan و Rahmani (1978) و T.fasciatus.




شكل 1: معظم المكونات الوظيفية لسمكة الطاووس




شكل 2: الوجه الجانبي لجمجمة سمكة الطاووس




شكل 3: الوجه الظاهري لسمكة الطاووس




شكل 4: القرنيوم العصبى لسمكة الطاووس. A) منظر بطنى, B) منظر ظهرى



شكل 5: تمفصل عظام: الفكية، الخيشومية و المعلق (منظر جانبي أيسر)




شكل 6: العظام الحشوية-الفكية المفككة لسمكة الطاوس




مصفوى أو سط



مصفوى جانبي أيسر



الميكتى



جبهى



قدالى علوي



قدالى خارجى أيمن



قدالى قاعدى




سمعى اسفينى أيمن





اسفينى جناحى أيسر


شكل 7: عظام القرنيوم العصبى المفكرة لسمكة الطاوس




شكل 8: العظام المفكرة المشتركة بين العصبى و الحشوى لسمكة الطاووس




خيشومي أمامى أيمن



خيشومي أيمن



خيشومي بينى أيمن



خيشومي سفلى أيمن

شكل 9: العظام الخيشومية و الخيشومية الأمامية لسمكة الطاووس



شكل 10: الجمجمة و الحزام الصدرى لسمكة الطاوس (منظر جانبي)



شكل 11: سمكة الطاوس (*Crenilabrus pavo*) (.Cuv. & Val)



References:

- Aerts, P. (1985) The intramandibular linkage in *Astatotilapia elegans* appearance and function of the mickelian cartilage. *J. Zool.*, Lond. (A) 205, 391-410.
- Benjamin, M. (1986) The oral sucker of *Gyrinocheilus aymonieri* (Teleostei: Gypriniformes). *J. Zool.*, Lond., Ser. B. 1, 211-254.
- Berg, L. S. (1904) Classification of fishes both recent and fossil. Works of the Zoological Institute Socialist Soviet republics, 5. Book 2: Moscow and Leningrad.
- Bhimachar, B. S. (1933) On the morphology of the skull of certain Indian catfishes. Half-yrly. *J. Mysore Univ.* 7, (2), 1-35.
- Birdsong, R. S. (1975) Osteology of *Microgobius signatus* poey. *Bull. Florida st. Mus., Biol. Sci.*, 19 (3), 136-185.
- Bliss, R. (1871) On the osteology of the anterior vertebrae in *Doras niger*, with a comparison of the structure of the dorsal fin in *Doras* and *Balistis*. *Proc. Boston soc. Nat. Hist.*, 14, 3-12.
- Bridge, T. W. and Haddon, A. C. (1893) Contributions to the anatomy of fishes 2. The air bladder and weberian ossicles in the Siluroid fishes. *Phil. Trans.*, 184-, 65-335.
- Colbert, E. H. (1961) Evolution of Vertebrates. Amer. Mus. Nat. Hist., Columbia Univ., New york.
- De Beer, G. R. (1966) An introduction to the Comparative Anatomy, Embryology and Evolution of Chordate Animals. British Mus. (Nat. Hist.), Biol. Ser., Lond.
- Dominique A. and Walter V. (1998) Ontogeny of the osteocranum in the African catfish, *Clarias gariepinus* Burchell (1822) (Siluriformes: Clariidae): Ossification sequence as a response to functional demands. *Journal of Morphology*. Volume 235, Issue 3, 183–237.

Eaton, T. H. (1948) Form and function in the head of the channel catfish, *Ictalurus lacustris-punctatus*. *J. Morph.*, 83, 181-194.

Faustino M. and Power D. M. (2001) Osteologic development of the viscerocranial skeleton in sea bream: alternative ossification strategies in teleost fish. *Journal of Fish Biology*. Volume 58, Issue 2, 537–572.

Gloria Arratia. (1990) Development and diversity of the suspensorium of the trichomycterids and comparison with loricarioids (Teleostei: Siluriformes). *Journal of Morphology*. Volume 205, Issue 2, 193–218.

Gloria A. and Hans-Peter S (1991) Palatoquadrate and its ossification and homology within osteichthyans. *Journal of Morphology*. Volume 208, Issue 1, 1–81.

Goodrich, E. S. (1930) Studies on the structure and Development of Vertebrates, Lond. 1-837.

Gosline, W. A. (1955) The osteology and relationships of certain gobioid fishes, with particular reference to the genera Kraemeria and Microdesmus. *Pacific sci.*, 9 (2), 158-170.

Gregory W.K. (1933) Fish skulls: Study of the evolution of the natural mechanisms. *Trans. Amer. Phil. Soc.*, New Ser., 23, article 11, 75-481.

Hildebrand, M. (1974) Analysis of Vertebrates structure. California Univ., U.S.A.

Hollister, G. (1932) Clearing and dying fish for bone study. *Zoologica*, 12.

Joseph, N. I. (1960) Osteology of *Wallago attu* bloch and Schneider. Part 1. Osteology of the head. *Proc. Nat. Inst. Sci. India*, 26 (B), 205-233.

Kindred, J. E. (1919) The skull of *Amiurus*. *IU. Boil. Monogr.*, 5, (1), 1-121.



Koji Fujimura and Norihiro Okada (2008) Bone development in the jaw of Nile tilapia *Oreochromis niloticus* (Pisces: Cichlidae). Development, Growth & Differentiation. Volume 50, Issue 5, 339–355.

Kole M. and Kevin W. (2015). Developmental osteology of *Sciaenops ocellatus* and *Cynoscion nebulosus* (Teleostei: Sciaenidae), economically important sciaenids from the western Atlantic. *Acta Zoologica*. Article first published online : 17 APR 2015, DOI: 10.1111/azo.12122.

Liem, K. F. (1967) Functional Morphology of the head of the Anabantoid Teleost Fish, *Helostoma temmincki*. *J. Morph.* 121 (2), 135-157.

Marshall, N. B. (1965) The life of fishes, The Weidenfeld and Nicolson Nat. Hist., Lond.

Matsubara, K. and Iwai, I. (1959) Description of a new sandfish, *Kraemeria sex-radiata*, from Japan, with special reference to its osteology. *J. Washington Acad. Sci.*, 49 (1), 27-32.

McMurrich, J. P. (1884) The osteology of *Amurius catus* (L) Gill. *Proc. Canad. Inst.*, 270-446.

Miller, P. (1977) Ichthyology (second edition). John Wiley and Sons, New York.

Miller, P. J. (1973) The osteology and adaptive features of *Rhyacichthys aspro* (Teleostei) and the classification of Gobioid fishes. *J. Zool.*, Lond. 171, 397-434.

Nawar, G. (1954) On the anatomy of *Clarias lazera*. I. Osteology. *J. Morph.*, 94, 551-586.

Orr, R. T. (1976) Vertebrate Biology (fourth edition). W. B. Saunders Company. Philadelphia.

Rahmani, A. R. and Khan, S. M. (1978) Hypobranchial skeleton of two Anabantoid Fishes. *J. Zool. Res.*, 2 (1), 63-70. (India)

Regan, C T. (1911a) The classification of the Teleostean fishes of the order Ostariophysi. Ann. Mag. Nat. Hist., 8, 553-577.

Regan, C. T. (1911b) The osteology and classification of the Gobioid fishes. Ann. and Mag. Nat. Hist., Ser. 8, 8(48), 729-733.

Ristovska M., Karaman B., Verraes W. and Adriaens D. (2006) Early development of the chondrocranium in *salmo letnica* (Teleostei: Salmonidae). Journal of Fish Biology. Volume 68, Issue 2, 458–480.

Sagemehl,M. (1884) Beitrage zur vergleichenden Anatomie der Fische. I. Das cranium von *Amia calava* L. Morch. Jb., 9, 177-228.

Sam Giles, Michael I. Coates, Russell J. Garwood, Martin D. Brazeau, Robert Atwood, Zerina Johanson and Matt Friedman (2015) Endoskeletal structure in *Cheirolepis* (Osteichthyes, Actinopterygii), An early ray-finned fish. Palaeontology. Volume 58, Issue 5, 849–870.

Smith, H. M. (1960) Evolution of Chordate structure. Holt, Rinehart and Winston, Inc. New York.

Vandewalle P., Focant B., Huriaux F. and Chardon M. (1992) Early development of the cephalic skeleton of *Barbus barbus* (Teleostei, Cyprinidae). Journal of Fish Biology. Volume 41, Issue 1, : 43–62.